

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>Dipartimento Area Servizi</p>	<p>FOGLIO INFORMATIVO TEST DI MEARES / STAMEY</p>	<p>All. 10 POp-DPC-MediLab-01A</p>
<p>U.O.C. LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev 06 16/10/2019</p>	<p>Pag. 1</p>


Esecuzione del test di Meares-Stamey

Il test di Meares - Stamey rappresenta il gold standard nella diagnostica delle prostatiti croniche. Si tratta di un esame complesso che richiede la collaborazione del paziente e che **prevede la prenotazione** presso gli sportelli del Laboratorio Analisi o inviando una *mail al seguente indirizzo specificando un recapito di contatto: puntoprelievi.ou@aulss6.veneto.it*

Il paziente deve presentarsi con la vescica piena, non deve avere eiaculato da 2 giorni e non deve essere in terapia antibiotica da almeno 1 mese.

Modalità di prelievo

- Appena alzati dal letto lavare con accuratezza i genitali esterni con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente.
- Raccogliere i primi 10 ml di urina (mitto iniziale) nel contenitore 1.
- Raccogliere ulteriori 10-15 ml di urina (mitto intermedio) nel contenitore 2.
- Recarsi nell'ambulatorio del Punto Prelievi indicato al momento della prenotazione per l'esecuzione del massaggio prostatico.
- La secrezione prostatica sarà raccolta con un tampone uretrale.
- Raccogliere 10 ml di urina (mitto iniziale) nel contenitore 3.



RACCOMANDAZIONI SIU - UTI

Una carica batterica elevata nel tampone uretrale e nel terzo campione di urina suggerisce una provenienza prostatica dei germi, mentre se la carica è maggiore nei primi campioni di urina è suggestiva per la presenza di batteriuria.