

ATTENZIONE

Se nella settimana antecedente l'intervento presentasse febbre o sintomi di malattia o malessere non definito, contattare la segreteria del **CPI (centro prenotazioni interventi)** da lunedì a venerdì

Tel. 049 9718091

Mail: cpi.piove@aulss6.veneto.it

CONTATTI

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Tel. 049 9718211

Mail: uoc.ortopedia-pds@aulss6.veneto.it

COORDINATRICE INFERIERISTICA

Tel. 049 9718211

Cell. 366 9389824

Mail: orietta.casetta@aulss6.veneto.it

AMBULATORIO / SALA GESSI

Tel. 049 9718146

PRE-OSPEDALIZZAZIONE

Tel. 049 9718637

UFFICIO FOTOCOPIE CARTELLE CLINICHE

Tel. 049 9718102

Orario sportello: da martedì a giovedì 9.00-12.00

Mail: cartellecliniche.piove@aulss6.veneto.it

ORARIO DI INGRESSO PER VISITA DEGENTI

ACCESSO CONSENTITO A UN SOLO FAMILIARE AL GIORNO

Dalle 16.30 alle 17.30 per postazione letto
con numero pari

Dalle 17.30 alle 18.30 per postazione letto
con numero dispari

ORARIO INFORMAZIONI AI FAMILIARI

Dalle 15.00 alle 18.30 telefonicamente al
numero 049 9718146 o in presenza presso sala
gessi 5° piano situata prima dell'accesso al
reparto.

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO “IMMACOLATA CONCEZIONE”

DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA
U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Direttore Dott. Davide Pernice

PROTESI DI SPALLA



PROTESI DI SPALLA, COS'È?

L'intervento di protesi di spalla prevede la sostituzione dell'osso e della cartilagine dell'articolazione della spalla danneggiati dall'artrosi o da lesione dei tendini, attraverso impianti anatomici o a geometria inversa in modo da ripristinare la normale funzione e togliere il dolore.

La protesi è costituita dalla componente omerale e glenoidea in titanio o leghe di cromo cobalto e inserto in polietilene.

PERCHÈ SI FA

Si interviene per ridurre il dolore e per acquisire una ripresa della funzionalità articolare

QUANDO SI FA

Di solito l'intervento chirurgico viene effettuato soltanto quando il dolore riferito dal paziente è importante e debilitante (talvolta anche in assenza di segni radiografici di artrosi) o in caso di perdita della funzione (mobilità della spalla) da lesione massiva dei tendini.

Un'altra frequente indicazione è in caso di fratture gravi, pluriframmentarie dell'omero prossimale.

CONTROINDICAZIONI ALL'INTERVENTO: LIMITI DI PESO E/O DI ETÀ

Non ci sono limiti di età, come controindicazioni assolute all'intervento, ma ci sono limiti dettati da patologie concomitanti come la paralisi del muscolo deltoide o infezioni in atto.

Altre patologie come il Parkinson e l'obesità aumentano significativamente il rischio di complicanze.

L'impianto non ha una durata illimitata e un utilizzo intenso o errato e, in pazienti giovani, per altre richieste funzionali può ridurre la durata.

L'indicazione per la soluzione chirurgica viene data sulla base del dolore e sulla disabilità avvertita dal paziente.

TIPO DI ANESTESIA

Solitamente l'intervento di protesi di spalla si esegue in anestesia plessica e generale.

L'anestesia plessica serve prevalentemente per un miglior controllo del dolore post-operatorio, mentre quella generale permette al chirurgo di eseguire l'intervento in modo sicuro e con la muscolatura rilassata. In ogni caso, la soluzione più idonea viene stabilita in accordo con il medico anestesista, nel corso della visita pre-operatoria.

DURATA DELL'INTERVENTO

La durata dell'intervento può variare, ma generalmente è intorno a 1 ora e 20 minuti.

La difficoltà e, di conseguenza, la durata dipendono dal singolo caso.

DEGENZA DELL'INTERVENTO

La degenza in ospedale dai 3-4 giorni presso il reparto ortopedico.

Successivamente il paziente prosegue le cure riabilitative ambulatorialmente.

I primi giorni è necessario attenersi alle indicazioni del personale sanitario.